

Forelæsning i Patologisk Anatomi – 2

Uterus

(Frau) Müller
(Herr) Wolf

- 1) Kongenit malformation.
- 2) Metaplasi.

WHO		RH
Simpel hyperplasi	-	irregulær hyperplasi
Kompleks hyperplasi	-	let adematøs hyperplasi
Atypisk simpel hyperplasi	-	svær adematøs hyperplasi
Atypisk kompleks hyperplasi	-	svær adematøs hyperplasi (med komplekse kirtler)

- 3) Betændelser:
- | | |
|----------|---|
| Akut: | <ul style="list-style-type: none"> • Purpural sepsis (i forb. med fødsel). • I forb. med cancer, der lukker af for kanalen. |
| Kronisk: | <ul style="list-style-type: none"> • Tuberkuløs endometrit kun sekundær til evt. tuberkuløs salpingit eller lungetuberkulose. |

- 4)
- Myometriose.
 - Endometriose – endometrievæv udenfor uterus.

5) Fibromyomer/leiomyom: kan sidde helt nede på portio.

6) Polypper (cervix): benignt men generende.

7) Vola: store blærer ved asporing af graviditet. De fødes.

8) Dysplasi/carcinoma in situ/manifest carcinom: ca. 10 år imellem hver stadie.

Cervixcancer:

Dispositioner: HPV 16/18, sociale forhold,
Stadium 0: Carcinoma in situ,
1: Cervix
2: Fornices, øverste del af vagina
3: Pelvis væggen, regionale lymfeknuder
4: Vesica, rectum, fjerne metastaser.

Kan lukke ureteres af og ødelægge nyrerne.

Incidens: ca. 600 (corpus), ca. 600 (), ca. 600 (cervix)

Corpuscancer: 5 års overlevelse ca. 80%, aldersmaksimum 65 år,

Dispositioner: Østrogen, nullipara, overvægt, sen menopause,
Der findes flere typer (mere eller mindre maligne).

Choriocarcinom: findes i uterus, ovariet og testis. Værre i de to sidste.

Mixed Müller tumor: sjældne.

Testis

Incidens: ca. 290 pr. år.

Prostata-cancer er den eneste tumor, som kan metastasere til testis, men ingen hos ptt. under 32 år.

Seminom: lobuleret, hvidt væv, lidt blødning, relativt blødt.

God prognose 95-100% helbredelse.

Cancere med gode prognoser: testis, børne-leukæmi, Hodgkin lymfom.

Ovariet

1) Betændelser: Akut
Kronisk: • Tuberkulose.

2) Polycystisk ovarium: hirsutisme, hormonforstyrrelse, ingen menstruation. Helt almindeligt med et par små-cyster.

3) Ovarietumorer:

Incidens: stigende (60), stor mortalitet.

Hypigt symptom ved ovarietumorer: ascites.