

Struma

Disposition:

- Struma hos slægtninge
- Thyreoideafunktionsforstyrrelser hos slægtninge
- Sygdomme i andre endokrine kirtler i slægten

Ekspositioner:

- Iodholdige kosttilskud eller medicin
- Rygning
- Ioniserende stråling

Anamnese:

- Størrelsens relation til menses, er pt. gravid.
- Globulusfornemmelse = Følelse af udfyldning på halsen
- Vejtrækningsgener, stridor, hæshed, synkebesvær
- Ømhed af kirtlen
- Træthed/Indre uro
- Hjertebanken
- Varmeintolerans/ Kuldsvær
- Vægttab/Øgning
- Øjensymptomer/synsforstyrrelser

Objektivt

- ET og AT
- Uro. Hudtemperatur, flapping, hæshed. vejtrækningsbesvær
- Chvosteck pos (umiddelbart postoperativt)
- Hals:
 - Struma størrelse, udbredning, konsistens.
 - Halsvenestase (Stokes krave),
 - palpable lymfeknuder, konsistens, størrelse, fixation
- Sår: hævelse, rødme. Dræn: sekret farve og mængde

Udredning

- UL og eller skintigrafi, evt. CT ved intratorakal udbredning
- Biopsi (FNAC, TRU-CUT,)
- Funktionsundersøgelser (TSH basisundersøgelse)
- (TPOantistoffer, TRAb, Thyreoglobulin antistoffer, serumtyreoglobulin)

Behandling

Lobektomi. (Totaltyreoidektomi), og eller resektion. Alternativer til kirurgi

Efterbehandling

- Eltroxintilskud ?
- Serum Ca²⁺ kontrol

Komplikationer til kirurgi:.

Recurransparensen < 1% Ved 1. gangsgrebet Forsinket blødning 0,5%

Hypocalcæmi. 1-2%