

SKIZOFRENI

FOREKOMST: 20 – 25.000 PERSONER I
DANMARK.

CA 0,5 % AF DEN VOKSNE BEFOLKNING

CA 1% RISIKO FOR AT BLIVE SYG

400 NYE TILFÆLDE OM ÅRET

BEGYNDER OFTEST I 20 – 25 ÅRS
ALDEREN

LIGE HYPPIG HOS BEGGE KØN

ÅRSAG

????????????????????

SÅRBARHEDSMODELLEN:

1. ARVELIGHED
2. FØDSELSSKADER
3. PSYKISK STRESS

1 SYG FORÆLDER: 6 % RISIKO

2 SYGE FORÆLDRE: 46 % RISIKO

SØSKENDE: 10 % RISIKO

ÅRSAGER TIL PSYKOTISK
GENNEMBRUD:

SPECIFIKKESTRESSPÅVIRKNINGER:

ÆNDRING I LIVSSITUATION

SORG/TAB

KONFLIKT

NARCISSISTISK KRÆNKELSE

USPECIFIKKE:

ISOLATION


SØVNMANGEL

DØGNRYTMEFORSTYRRELSER

LEGEMLIG SYGDOM / ALKOHOL /
STOFFER

FORLØB

PSYKOSE



20 % : EN ENKELT PSYKOTISK FASE

30 % : GENTAGNE EPISODER, AFBRUDT AF PERIODER NÆSTEN UDEN **SYMPT.**

30 % : ADSKILLIGE PSYKOTISKE FASER UDEN MELLEMLIGGENDE **SYMPTOMFRIHED**

20 % : **TERAPIRESISTENT PSYKOSE.**

SYMPTOMER

FUNDAMENTAL
FORSTYRRELSE AF:

TÆNKNING

SANSNING

FØLELSESLIV

POSITIVE SYMPTOMER:

TANKEPÅVIRKNINGSOPLEVELSER:

TANKE-FRADRAG

TANKE-PÅFØRING

TANKE-UDSPREDNING

TANKE-HØRLIGHED

HALLUCINATIONER:

HØRELSE : STEMMER I 3. PERSON

SYN

LUGT/ SMAG

FØLESANS

VRANGFORESTILLINGER:

(= **PARANOIDE** FORESTILLINGER)

FORFØLGELSE**SFORE**STILLINGER

STORHEDSFORESTILLINGER

JALOUSIFORESTILLINGER

HYPOKONDRE /LEGEMLIGE
FORESTILLINGER

STYRINGSOPLEVELSER

PÅFØRTE HANDLINGER

PÅFØRTE **VILJESIMPULSER**

PÅFØRTE FØLELSER

KATATONE FORSTYRRELSER

(= **BEVÆGEFORSTYRRELSER**)

NEDSAT BEVÆGELSE

FYSISK URO

APARTE BEVÆGELSER

SPROGLIGE FORSTYRRELSER

SORT TALE

ORDSALAT

NEOLOGISMER (**ORDNYDANNELSER**)

NEGATIVESYMPTOMER

TRÆGHED

SLØVHED

AFFEKT-AFFLADNING

INITIATIVLØSHED

PASSIVITET

SPROGFATTIGDOM

KONTAKT-FORRINGELSE

MANGLENDE INTERESSER

TOM ELLER FORMÅLSLØS ADFÆRD

INDSYNKEN I SIG SELV

SOCIAL TILBAGETRÆKNING.

PRODROMER

(FORVARSLINGER)

PATIENTEN:

NOGET ER GALT, SVÆRT AT FORKLARE

FØLER SIG ÆNDRET, OPLØST

OVERLØDIGE IDEER, RELIGIØSE
INTERESSER

SVÆRT AT STYRE TANKERNE

KONCENTRATIONSBESVÆR

SANSEFORVRÆNGNINGER

BANGE FOR AT MISTE KONTROL

PRØVER DESPERAT AT VÆRE AKTIV

SELVBEHANDLING MED
ALKOHOL/STOFFER

OMGIVELSERNE:

PATIENTEN FÅR **NEUROSELIGNENDE**
SYMPTOMER, ANGST, DEPRESSION.

SLUTTER SKOLE, JOB

FORANDRING AF INTERESSER

PASSIV/ TILBAGETRUKKET

ADFÆRDSÆNDRING

BESKYTTENDE FAKTORER:

FAMILIE /NETVÆRK

ARBEJDE

INDRE FØLELSE AF SAMMENHÆNG.